

Description d'une nouvelle espèce d'**Unio**
provenant du **Soudan occidental**,

PAR G. WATTEBLED.

1. **UNIO DECAMPSIANUS**, Wattebled (Pl. VII, fig. 1).

Testa sat tenuis, ovata, vix compressa, antice rotundata, postice subtruncata; margine superiore rectiusculo, inferiore arcuato; umbonibus obtusis et erosis; epidermide nigro-brunnea; ligamento minuto et abbreviato; dentes cardinales parvi et compressi, lamellis tenuibus; impressionibus muscularibus parum validis, palliali subnulla. Margarita roseo-cærulea et nitidula. — Long. 40 mill., latit. 26 mill., diam. 16 mill.

Coquille assez mince, de forme ovale et faiblement comprimée, arrondie du côté antérieur, et subtronquée à la partie postérieure; bord supérieur presque droit, bord inférieur régulièrement arqué; crochets obtus et érodés; épiderme d'un noir brunâtre. Ligament assez court et très peu saillant; dents cardinales petites et comprimées, lamelles minces. Impressions musculaires peu profondes, impression palléale presque nulle. Nacre interne d'un rose blenâtre assez brillant.

Longueur 40 millimètres, largeur 26 millimètres, diamètre 16 millimètres.

Hab. Le Niger, à Bamakou.

Obs. Je dédie cette espèce à mon bon camarade et ami M. Descamps, qui l'a recueillie, pendant qu'il était attaché à la mission Borgnis-Desbordes. Elle est fort intéressante à cause de sa provenance, car on ne connaît pas

jusqu'ici beaucoup de Mollusques qui aient été recueillis dans la partie supérieure dans du Niger.

G. W.

Corrigenda.

PAR LE D^r SOUVERBIE.


PLEUROTOMA (CITHARA) GUESTIERI, Souverbie.

Pleurotoma (Cithara) Guestieri, Souverbie. Journ. Conchyl. t. XX, p. 562, et t. XXI, p. 58, pl. iv, fig. 5.

A la suite d'un nouvel examen comparatif accidentel que nous avons tout récemment été appelé à faire de notre type (*unique*) de cette espèce, avec cinq autres exemplaires reçus de Calédonie, où, paraît-il, elle n'est point rare, nous nous sommes aperçu que, trompé sans aucun doute par nous ne savons trop quelle cause de fausse apparence, nous avons indiqué l'espèce comme *munie d'une striation spirale, qu'aujourd'hui nous reconnaissons n'exister positivement sur aucun des six exemplaires mentionnés.*

En conséquence, il y aura donc lieu de supprimer, dans notre diagnose primitive (texte latin et français), *loc. citato*, tout ce qui se rapporte à l'indication de ce caractère, *la striation du test n'existant, certainement, que dans le sens longitudinal.*

S.



Arnoul del.

Imp. Biequet fir. Paris.

- | | |
|--|--|
| Unio Decampsianus Watterbled | 4 Placostylus Ouveanus Dotzauer, scalarif. |
| Melania Savinierei, Brot ms. | 5 Helix aimophila Bourguignat |
| Placostylus Ouveanus, Dotzauer sinistr | 6 H. — aimophila var Tchihatcheffi Kobelt |